

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 26

**OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) ustala się na dzień 12 kwietnia 2024 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2024 r. (poz. 26)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 12 kwietnia 2024 r.

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa | Postać | Moc | Wielkość opakowania |
|-----|--|---------------------------------------|---|--------------------|---|
| 1. | Abasaglar | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów 3 ml |
| 2. | Abilify Maintena | <i>Aripiprazolum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstrukcji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiołki |
| 3. | Actilyse 10 | <i>Alteplasmum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 10 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. |
| 4. | Actilyse 20 | <i>Alteplasmum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 20 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp. |
| 5. | Actilyse 50 | <i>Alteplasmum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 50 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp. |
| 6. | Activelle | <i>Estradiolum + Norethisteronum</i> | tabletki powlekane | 1 mg + 0,5 mg | 28 tabl. |
| 7. | Actrapid Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 8. | Alvesco 160 | <i>Ciclesonidum</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór | 160 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 120 dawek |
| 9. | Apidra | <i>Insulinum glulisinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 10. | Asamax 500 | <i>Mesalazinum</i> | tabletki dojelitowe | 500 mg | 100 tabl. |
| 11. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |
| 12. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 27 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |
| 13. | Atenza | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. 60 tabl. (2 op. x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.) |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|---|------------------------------|---|
| 14. | Atimos | <i>Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | 12 mcg/dawkę odmierzoną | 1 poj. 120 dawek |
| 15. | Atrovent | <i>Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji | 0,25 mg/ml | 1 butelka 20 ml |
| 16. | Aulin | <i>Nimesulidum</i> | granulat do przygotowania zawiesiny doustnej | 100 mg | 30 sasz. 2 g |
| 17. | Beriner 1500 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | 1500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejadowy |
| 18. | Beriner 500 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem |
| 19. | Berodual | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | roztwór do nebulizacji | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 20 ml |
| 20. | Berodual N | <i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) |
| 21. | Braltus | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 10 mcg | 30 kaps. + 1 inhalator |
| 22. | Brintellix | <i>Vortioxetini hydrobromidum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. |
| 23. | Budair | <i>Budesonidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | 200 mcg/dawkę odmierzoną | 1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem |
| 24. | Clopizam | <i>Clozapinum</i> | tabletki | 100 mg | 100 tabl. 50 tabl. |
| 25. | Clopizam | <i>Clozapinum</i> | tabletki | 25 mg | 50 tabl. |
| 26. | Concerta | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. |
| 27. | Concerta | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. |
| 28. | Cuvitru | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 40 ml; 1 fiol. 5 ml |
| 29. | Daivobet | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i> | żel | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 butelka 30 g; 1 butelka 60 g |
| 30. | Detriol | <i>Calcitriolum</i> | kapsułki miękkie | 0,25 mcg | 100 kaps. |
| 31. | Detriol | <i>Calcitriolum</i> | kapsułki miękkie | 0,5 mcg | 100 kaps. |
| 32. | DHC Continus | <i>Dihydrocodeini tartras</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg | 60 tabl. |
| 33. | DHC Continus | <i>Dihydrocodeini tartras</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 90 mg | 60 tabl. |
| 34. | DuoResp Spiromax | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | proszek do inhalacji | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------------------|--|
| 35. | DuoResp Spiromax | <i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | proszek do inhalacji | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 120 dawek |
| 36. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 25 mcg/h | 5 szt. |
| 37. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 50 mcg/h | 5 szt. |
| 38. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 100 mcg/h | 5 szt. |
| 39. | Durogesic | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 75 mcg/h | 5 szt. |
| 40. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14 | - | - | - | - |
| 41. | EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14 | - | - | - | - |
| 42. | Enstilar | <i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i> | piana na skórę | (50 mcg + 0,5 mg)/g | 1 poj. 60 g |
| 43. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,75 mg | 30 tabl. |
| 44. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 30 tabl.; 90 tabl. |
| 45. | Envarsus | <i>Tacrolimusum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. |
| 46. | Femoston conti | <i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i> | tabletki powlekane | 1 mg + 5 mg | 28 tabl. |
| 47. | Fiasp | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j/ml | 1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml Penfill |
| 48. | Finlepsin 200 retard | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg | 50 tabl. |
| 49. | Finlepsin 400 retard | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 30 tabl.; 50 tabl. |
| 50. | Firazyr | <i>Icatibantum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 10 mg/ml | 1 amp.-strzyk. |
| 51. | Firmagon | <i>Degarelixum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 80 mg | 1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka + 1 nasadka na fiolkę |
| 52. | Flebogamma DIF | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml |
| 53. | Formodual | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek |
| 54. | Formodual | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór, | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 180 dawek |
| 55. | Fostex | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek |
| 56. | Fostex | <i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i> | aerazol inhalacyjny, roztwór | (200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 180 dawek |
| 57. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 5 mg | 50 tabl. |
| 58. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 50 tabl. |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|--|---------------------------------|--|
| 59. | Gabitril | <i>Tiagabinum</i> | tabletki powlekane | 15 mg | 50 tabl. |
| 60. | Gamma anty-D 150 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 150 mcg/ml | 1 amp. 1 ml |
| 61. | Gamma anty-D 50 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 50 mcg/ml | 1 amp. 1 ml |
| 62. | Gardasil 9 | <i>Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana, adsorbowana), 9-walentna</i> | zawiesina do wstrzykiwań | – | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły |
| 63. | Gensulin M30 (30/70) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 64. | Gensulin M40 (40/60) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 65. | Gensulin M50 (50/50) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 66. | Gensulin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 67. | Gensulin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml |
| 68. | GlucaGen 1 mg HypoKit | <i>Glucagoni hydrochloridum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp. |
| 69. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | 900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł |
| 70. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) | 1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł |
| 71. | Gonal-f | <i>Follitropinum alfa</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 75 j.m. (5,5 mcg) | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml |
| 72. | Hizentra | <i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 50 ml; 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 5 ml |
| 73. | Humalog | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 74. | Humalog Mix 25 | <i>Insulinum lisprum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 75. | Humalog Mix 50 | <i>Insulinum lisprum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|---------------------------|--|
| 76. | Humulin M3 (30/70) | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 77. | Humulin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 78. | Humulin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 79. | Hydroxyurea medac | <i>Hydroxycarbamidum</i> | kapsułki twarde | 500 mg | 100 kaps. |
| 80. | HyQvia | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml; 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml; 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml; 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml |
| 81. | Ig Vena | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 50 ml |
| 82. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 50 mcg/dawkę | 1 butelka 3,2 ml (20 dawek) |
| 83. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 100 mcg/dawkę | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek) |
| 84. | Instanyl | <i>Fentanylum</i> | aerazol do nosa, roztwór | 200 mcg/dawkę | 1 butelka 5,3 ml (40 dawek) |
| 85. | Insulatard Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 86. | Insulin aspart Sanofi | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 87. | Insulin lispro Sanofi | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 88. | Insuman Basal | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 89. | Invokana | <i>Canagliflozinum</i> | tabletki powlekane | 100 mg | 30 szt. |
| 90. | Jardiance | <i>Empagliflozinum</i> | tabletki powlekane | 10 mg | 28 tabl. |
| 91. | Kiovig | <i>Immunoglobulinum humanum normale</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 300 ml; 1 fiol. 50 ml |
| 92. | Kreon 25 000 | <i>Pancreatinum</i> | kapsułki dojelitowe | 25 000 j.Ph.Eur. Lipazy | 50 kaps. |
| 93. | Lantus | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar |
| 94. | Levemir | <i>Insulinum detemirum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml Penfill |
| 95. | Lipancrea 16 000 | <i>Pancreatinum</i> | kapsułki | 16 000 j. Ph. Eur. lipazy | 60 kaps. |
| 96. | Liprolog | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkładów 3 ml |
| 97. | Liprolog Junior KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j/ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych |
| 98. | Liprolog KwikPen | <i>Insulinum lisprum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych |
| 99. | Madopar | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 200 mg + 50 mg | 100 kaps. |

| | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 100. | Madopar 125 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej | 100 mg + 25 mg | 100 tabl. |
| 101. | Madopar 125 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. |
| 102. | Madopar 250 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki | 200 mg + 50 mg | 100 tabl. |
| 103. | Madopar 62,5 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 50 mg + 12,5 mg | 100 kaps. |
| 104. | Madopar 62,5 mg | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej | 50 mg + 12,5 mg | 100 tabl. |
| 105. | Madopar HBS | <i>Levodopum + Benserazidum</i> | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. |
| 106. | Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 100 mcg/h | 5 sasz. |
| 107. | Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 12 mcg/h | 5 sasz. |
| 108. | Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 25 mcg/h | 5 sasz. |
| 109. | Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 50 mcg/h | 5 sasz. |
| 110. | Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny | <i>Fentanylum</i> | system transdermalny | 75 mcg/h | 5 sasz. |
| 111. | Medikinet 10 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 10 mg | 30 tabl. |
| 112. | Medikinet 20 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 20 mg | 30 tabl. |
| 113. | Medikinet 5 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | tabletki | 5 mg | 30 tabl. |
| 114. | Medikinet CR 10 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 10 mg | 30 kaps. |
| 115. | Medikinet CR 20 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 20 mg | 30 kaps. |
| 116. | Medikinet CR 30 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 30 mg | 30 kaps. |
| 117. | Medikinet CR 40 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 40 mg | 30 kaps. |
| 118. | Medikinet CR 5 mg | <i>Methylphenidati hydrochloridum</i> | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 5 mg | 30 kaps. |
| 119. | Menopur | <i>Menotropinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 1200 IU FSH + 1200 IU LH | 1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstytucji + 18 strzykawek |
| 120. | Minirin Melt | <i>Desmopressinum</i> | liofilizat doustny | 120 mcg | 30 szt. |
| 121. | Minirin Melt | <i>Desmopressinum</i> | liofilizat doustny | 60 mcg | 30 szt. |
| 122. | Mixtard 30 Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 123. | Mixtard 50 Penfill | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 124. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 10 mg | 60 tabl. |
| 125. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 100 mg | 60 tabl. |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|--------------|---|
| 126. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 200 mg | 60 tabl. |
| 127. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 30 mg | 60 tabl. |
| 128. | MST Continus | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu | 60 mg | 60 tabl. |
| 129. | Neocate Junior (o smaku neutralnym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 130. | Neocate Junior (o smaku truskawkowym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 131. | Neocate Junior (o smaku waniliowym) | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 132. | Neocate LCP | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | – | 400 g |
| 133. | Nimesil | <i>Nimesulidum</i> | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 100 mg | 30 sasz. 2 g |
| 134. | NovoMix 30 Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 135. | NovoMix 50 Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 136. | NovoRapid | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 1 fiol. 10 ml |
| 137. | NovoRapid Penfill | <i>Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 138. | Nutramigen 1 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzenia roztworu | - | 400 g |
| 139. | Nutramigen 2 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzenia roztworu | - | 400 g |
| 140. | Nutramigen 3 LGG Complete | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do sporządzenia roztworu | - | 400 g |
| 141. | Nutramigen PURAMINO | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek do przygotowania roztworu doustnego | - | 400 g |
| 142. | Nutramigen PURAMINO JUNIOR | <i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i> | proszek | - | 400 g |
| 143. | Octagam 10% | <i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 50 ml |
| 144. | Omnitrope | <i>Somatropinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 10 mg/1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml |
| 145. | Omnitrope | <i>Somatropinum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 5 mg/1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml |
| 146. | OxyContin | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 60 tabl. |
| 147. | OxyContin | <i>Oxycodoni hydrochloridum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 20 mg | 60 tabl. |
| 148. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,25 mg | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 149. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,5 mg | 1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 150. | Ozempic | <i>Semaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 1 mg | 1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus |
| 151. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 60 tabl. |

| | | | | | |
|------|----------------|--|------------------------------------|------------------------|--|
| 152. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 60 tabl. |
| 153. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg | 60 tabl. |
| 154. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg | 60 tabl. |
| 155. | Palexia retard | <i>Tapentadolium</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 250 mg | 60 tabl. |
| 156. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg | 100 tabl. |
| 157. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 g | 60 tabl. |
| 158. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | zawiesina doodbytnicza | 1 g/100 ml | 7 butelek 100 ml |
| 159. | Pentasa | <i>Mesalazinum</i> | czopki doodbytnicze | 1 g | 28 szt. w blistrach |
| 160. | Polhumin MIX-2 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m/ml | 5 wkładów 3 ml |
| 161. | Polhumin MIX-3 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m/ml | 5 wkładów 3 ml |
| 162. | Polhumin MIX-4 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 163. | Polhumin MIX-5 | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 164. | Polhumin N | <i>Insulinum humanum</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 165. | Polhumin R | <i>Insulinum humanum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 166. | Poltram Combo | <i>Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolium</i> | tabletki powlekane | 37,5 mg + 325 mg | 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 167. | Pradaxa | <i>Dabigatranum etexilatium</i> | kapsułki twarde | 110 mg | 30 kaps. |
| 168. | Privigen | <i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i> | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 400 ml; 1 fiol. 50 ml |
| 169. | Pulmozyme | <i>Dornasum alfa</i> | roztwór do nebulizacji | 1 mg/ml | 30 amp. 2,5 ml |
| 170. | Purethal | <i>Mieszanki alergoidów pyłku roślin</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 20 000 AUM/ml | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą |
| 171. | Purethal | <i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i> | zawiesina do wstrzykiwań | 20 000 AUM/ml | 1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą |
| 172. | Rapamune | <i>Sirolimusum</i> | tabletki drażowane | 1 mg | 30 tabl. |
| 173. | Rapamune | <i>Sirolimusum</i> | roztwór doustny | 1 mg/ml | 1 butelka 60 ml + 30 strzyk. |
| 174. | Rhophylac 300 | <i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła |
| 175. | Rigevidon | <i>Ethinylestradiolum+ Levonorgestrelum</i> | tabletki powlekane | 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. |

| | | | | | |
|------|---|--|---|-----------------------------|---|
| 176. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły |
| 177. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard®3 |
| 178. | Rispolept Consta | <i>Risperidonum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard®3 |
| 179. | Ryzodeg | <i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml |
| 180. | Sabril | <i>Vigabatrinum</i> | tabletki powlekane | 500 mg | 100 tabl. |
| 181. | Sabril | <i>Vigabatrinum</i> | granulat do sporządzania roztworu doustnego | 500 mg | 50 sasz. |
| 182. | Sevredol | <i>Morphini sulfas</i> | tabletki powlekane | 20 mg | 60 tabl. |
| 183. | Somatuline Autogel | <i>Lanreotidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 120 mg/dawkę | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml |
| 184. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm. | - | - | - | - |
| 185. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm. | - | - | - | - |
| 186. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm. | - | - | - | - |
| 187. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm. | - | - | - | - |
| 188. | SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm | - | - | - | - |
| 189. | Spiriva | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułkach twardej | 18 mcg | 30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem |
| 190. | Spiriva Respimat | <i>Tiotropium</i> | roztwór do inhalacji | 2,5 mcg/dawkę odmierzoną | 1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat |
| 191. | Srivasso | <i>Tiotropium</i> | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 18 mcg | 30 kaps.; 30 kaps. + 1 inhalator; |

| | | | | | |
|------|-----------------|--|--|---|---|
| 192. | Suliqua | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml + 33 mcg/ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 193. | Suliqua | <i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml + 50 mcg/ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 194. | Symkinet MR | Methylphenidati hydrochloridum | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 10 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |
| 195. | Symkinet MR | Methylphenidati hydrochloridum | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 20 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 84 kaps. 100 kaps. |
| 196. | Symkinet MR | Methylphenidati hydrochloridum | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 30 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |
| 197. | Symkinet MR | Methylphenidati hydrochloridum | kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde | 40 mg | 28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps. |
| 198. | System Conti | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster | 3,2 mg + 11,2 mg | 8 plastrów |
| 199. | System Sequi | <i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i> | system transdermalny, plaster | 1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg | 4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti |
| 200. | Tegretol CR 200 | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 200 mg | 50 tabl. |
| 201. | Tegretol CR 400 | <i>Carbamazepinum</i> | tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 400 mg | 30 tabl. |
| 202. | Torecan | <i>Thiethylperazinum</i> | tabletki powlekane | 6,5 mg | 50 tabl. |
| 203. | Toujeo | <i>Insulinum glarginum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 300 j/ml | 10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar |
| 204. | Tresiba | <i>Insulinum degludecum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml; 10 wkładów 3 ml |
| 205. | Tresiba | <i>Insulinum degludecum</i> | roztwór do wstrzykiwań | 200 j./ml | 3 wstrzykiwacze 3 ml |
| 206. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 263 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły |

| | | | | | |
|------|---------------|---|---|------------------------|---|
| 207. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 350 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły |
| 208. | Trevicta | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 525 mg (200 mg/ml) | 1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły |
| 209. | Trimbow | <i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i> | aerozol inhalacyjny, roztwór | 87 mcg + 5 mcg + 9 mcg | 1 poj. 180 dawek |
| 210. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 0,75 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 211. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 1,5 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 212. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 3 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 213. | Trulicity | <i>Dulaglutidum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 4,5 mg/0,5 ml | 2 wstrzykiwacze 0,5 ml |
| 214. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 10 mg | 30 tabl. |
| 215. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 30 tabl. |
| 216. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 200 mg | 30 tabl. |
| 217. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 30 mg | 30 tabl. |
| 218. | Vendal retard | <i>Morphini hydrochloridum</i> | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 60 mg | 30 tabl. |
| 219. | Ventolin | <i>Salbutamolum</i> | aerozol wziewny, zawiesina | 100 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 200 dawek |
| 220. | Versatis | <i>Lidocainum</i> | plaster leczniczy | 700 mg | 5 plastrów; 30 plastrów |
| 221. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 75 mg | 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły |
| 222. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły |
| 223. | Xeplion | <i>Paliperidonum</i> | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg | 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły |
| 224. | Zarzio | <i>Filgrastimum</i> | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji | 30 mln. j./0,5 ml | 5 amp.-strz.0,5 ml |
| 225. | Zarzio | <i>Filgrastimum</i> | roztwór do wstrzykiwań lub infuzji | 48 mln. j./0,5 ml | 5 amp.-strz.0,5 ml |
| 226. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 210 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
| 227. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------|---|--------|---|
| 228. | Zypadhera | <i>Olanzapinum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 405 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły |
|------|-----------|--------------------|---|--------|---|